



Gewas	Toepassingsmethode	Toepassingsstadium	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering Hamerol	Max aantal toepassingen (interval)	Veiligheids-termijn
Pootgoed aardappelen	Dompeling of bespuiting met laag watervolume	Vóór het poten	Rhizoctonia, aaltjes	2,5 L/m ³ kist; Aanvullen met 7,5 L water	1 (nvt)	geen
Aardappelen (alle typen)	Veur	Tijdens poten	Rhizoctonia, aaltjes	5-7 L/ha; Aanvullen met 50 L water/ha	1 (nvt)	geen
	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Phytophthora, Alternaria	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Granen	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot aarontwikkeling	Fusarium, plantpathogene schimmels en bacteriën	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
	Zaaizaadbehandeling met laag watervolume	Vóór zaai	Plantpathogene schimmels en bacteriën	4 L/HL	1 (nvt)	geen
Groenteteelt (bedekt en onbedekt)	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Fusarium, plantpathogene schimmels en bacteriën	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Uien	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Valse meeldauw	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Suiker- en voederbieten	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Cercospora	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Voedergewassen	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Plantpathogene schimmels en bacteriën	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Aromatische kruidgewassen (bedekt en onbedekt)	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Plantpathogene schimmels en bacteriën	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Kleinfruit/zachtfruit (bedekt en onbedekt)	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Botrytis, plantpathogene schimmels en bacteriën	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Kleinfruit/zachtfruit (struikvorm)	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Plantpathogene schimmels en bacteriën	3-4 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Hardfruit (boomvorm)	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Plantpathogene schimmels en bacteriën	4 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen
Bloembollen en -knollen	Boldompeling	Vóór het poten	Fusarium	2,5%	1 (nvt)	geen
	Grondbehandeling	Vóór of tijdens poten	Rhizoctonia, Pythium	10 L/ha	1 (nvt)	geen
	Gewasbehandeling met 200-400 L water/ha	Gewasbespuiting	Botrytis	3 L/ha	4-8 (21 dagen)	geen