

BASISSTOF VOOR GEBRUIK ALS GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

CHITOSANHYDROCHLORIDE

Overeenkomstig art. 23 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, is het gebruik van de hierna beschreven basisstof onder de specifieke voorwaarden zoals vastgelegd in het evaluatieverslag van deze stof toegelaten.

Dit document geeft de vertaalde inhoud weer van een toelating op Europees niveau van deze basisstof. De wettelijke basis voor de bereiding en het gebruik van deze basisstof kunnen geraadpleegd worden in het evaluatieverslag waarnaar hieronder verwezen wordt.

Evaluatieverslag van deze stof :

Algemene naam (ISO)	/
Chemische naam (IUPAC)	/
Chemische naam (CA)	/
Botanische classificatie	/
Synoniemen	chitosanhydrochloride Lineair polysaccharide samengesteld uit willekeurig verdeelde 1-4 gekoppelde D-glucosamine en N-acetyl-D-glucosamine, geproduceerd door de de-acetylatie van chitine.
Te gebruiken deel	/
CAS-nr	70694-72-3
CIPAC-nr en EEC-nr	/
FAO-specificatie	/
Zuiverheid	Europese Pharmacopeia. Gezien chitosan een product van dierlijke oorsprong is, moet het voldoen aan de vereisten van de Verordening (EG) n° 1069/2009 en de Verordening van de Commissie (EU) n° 142/2011.
Moleculaire formule	/
Relevante onzuiverheden	maximumgehalte aan zware metalen: 40 ppm
Moleculaire massa en structuurformule	/
Gebruikswijze	Chitosanhydrochloride, zoals hierboven gespecificeerd, voor gebruik in een waterige oplossing in verschillende teelten of voor zaaizaadbehandeling.



Bereidingswijze van de oplossing	/
Concentratie van de werkzame stof in de formulering	100% chitosanhydrochloride
Andere eigenschappen	/

BIJLAGE

GEBRUIKEN

De toepassingen waardoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

alle teelten (*any crop*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 0,1 - 0,8 kg/ha, 0,1-0,8 kg/ha voor fruitteelt, sierplanten en suikerbieten. 0,1-0,4 kg/ha voor andere teelten.

Aantal toepassingen: 4 tot 8

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag of gemiddeld volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 0,1 - 0,8 kg/ha, 0,1-0,8 kg/ha voor fruitteelt, sierplanten en suikerbieten. 0,1-0,4 kg/ha voor andere teelten.

Aantal toepassingen: 4 tot 8

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag of gemiddeld volume

alle teelten (*any crop*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 0,1 - 0,8 kg/ha, 0,1-0,8 kg/ha voor fruitteelt, sierplanten en suikerbieten. 0,1-0,4 kg/ha voor andere teelten.

Aantal toepassingen: 4 tot 8

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag of gemiddeld volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 0,1 - 0,8 kg/ha, 0,1-0,8 kg/ha voor fruitteelt, sierplanten en suikerbieten.
0,1-0,4 kg/ha voor andere teelten.

Aantal toepassingen: 4 tot 8

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag of gemiddeld volume

bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten) (*ornamental bulb plants*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor het planten

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 0,1 - 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: dompelen (behandeling van plantmateriaal)

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 0,1 - 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: dompelen (behandeling van plantmateriaal)

zaaizaden van wintertarwe (*Triticum aestivum* (*winter*))

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring))

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter))

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomergerst (*Hordeum vulgare* (spring))

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van winterrogge (*Secale cereale*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1



Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomerrogge (*Secale cereale*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal
Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van winterhaver (*Avena sativa*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal
Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomerhaver (*Avena sativa*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van wintertriticale (*Triticum x Secale*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomertriticale (*Triticum x Secale*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van winterspelt (*Triticum spelta* (winter))

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomerspelt (*Triticum spelta* (spring))

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van winteremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomeremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van winterenkoorn (*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van winterkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomerkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van winterdurum (*Triticum durum*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van zomerdurum (*Triticum durum*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

zaaizaden van bieten (*Beta vulgaris*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: dompelen (behandeling van plantmateriaal)

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: dompelen (behandeling van plantmateriaal)

Opmerking: bespuiting aan laag volume

aardappelpootgoed (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: behandelingslokaal

Gewastype: /

Toepassingsstadium: voor het planten

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naoogst behandelingen zijn beschikbaar op fytowebe.nl/aardappelen.

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: dompelen (behandeling van plantmateriaal)

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: bacteriën (*Bacteria*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: dompelen (behandeling van plantmateriaal)

Opmerking: bespuiting aan laag volume

Ter bestrijding van: pathogene schimmels (*Fungi*)

Dosis: 50 - 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: bespuiting aan laag volume

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

alle teelten (*any crop*): Consulteer www.fytoweb.be voor een volledige omschrijving.

bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten) (*ornamental bulb plants*): alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie

zaaizaden van wintertarwe (*Triticum aestivum (winter)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomertarwe (*Triticum aestivum (spring)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van wintergerst (*Hordeum vulgare (winter)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomergerst (*Hordeum vulgare (spring)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterrogge (*Secale cereale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerrogge (*Secale cereale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterhaver (*Avena sativa*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerhaver (*Avena sativa*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van wintertriticale (*Triticum x Secale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomertriticale (*Triticum x Secale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterspelt (*Triticum spelta (winter)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerspelt (*Triticum spelta (spring)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van wintereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*): Voor de behandeling van zaden,

gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterdurum (*Triticum durum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerdurum (*Triticum durum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van bieten (*Beta vulgaris*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten. Enkel voor suiker- en voederbieten, niet voor rode biet.

aardappelpootgoed (*Solanum tuberosum*): Voor de ontsmetting van pootaardappelen, deze kunnen eventueel verkocht worden voor consumptie voor de behandeling plaatsgevonden heeft